



STOOL COLLECTION

Patient Instructions

H. pylori antigen
Rotavirus antigen
Cyclospora
Stool pH



Obtain (1) stool cup from the laboratory for each test ordered.

The container should be dry, clean or sterile, and have a leak-proof cap.

Instructions for Collection:

1. Avoid using antacids, barium, bismuth, antibiotics, anti-amebics, anti-diarrheal medication or oily laxative prior to collection of the specimen.
2. Avoid contaminating the stool specimen with urine or water during collection.
3. Diapers are not acceptable for specimen collection. To collect a stool specimen from a child in diapers, line the diaper with plastic wrap, collect the stool, and transfer to the collection container.
4. Collect the specimen in a clean specimen pan, plastic bag, or saran wrap placed over the toilet seat.
5. Using a tongue depressor, transfer about 10 grams of stool to the sterile cup and seal the top. Repeat with a separate cup for each test ordered.
6. Label the container (not the lid) with patient name, date of birth, and date/time of collection.
7. FREEZE specimen promptly after collection.
8. Deliver to lab ON ICE within 48 HOURS of collection.



COLECCIÓN DEL EXCREMENTO

Instrucciones para pacientes

H. pylori antigen
Rotavirus antigen
Cyclospora
Stool pH



Obtener un contenedor de heces del laboratorio para cada prueba ordenada.

El recipiente debe ser un frasco limpio y estéril con una tapa hermética.

Instrucciones para tomar la muestra:

1. Evite usar antiácidos, bario, bismuto y medicamentos antibióticos, anti-amibianos y anti-diarreicos o laxantes oleosos antes de tomar la muestra.
2. Evite contaminar la muestra de heces con orina o con agua durante su recolección.
3. No son aceptables las muestras tomadas de pañales. Para tomar una muestra de un niño(a) que use pañales, cubra el pañal con una envoltura de plástico, tome la muestra del plástico con que cubrió el pañal y transfiera la muestra al recipiente.
4. Tome la muestra usando una bandeja limpia para muestras, una bolsa de plástico coloque una película de plástico transparente sobre el asiento del inodoro.
5. Con un abatelenguas, transfiera 5 gramos de materia fecal al frasco para muestras y selle la tapa.
6. Adhiera una etiqueta al recipiente (no a la tapa) con el nombre del paciente, fecha de nacimiento y la fecha y hora en que tomó la muestra.
7. CONGELE la muestra inmediatamente después de tomarla.
8. Lleve el recipiente con la muestra al laboratorio **SOBRE HIELO**, dentro de las 48 HORAS siguientes a su colección.